

Richtlijnen voor het gebruik van de insulinepomp .

Instructies voor het gebruik van de insuline pomp (bv.bij operatie)

Conventie Diabetici
Salvatorstraat 20
3500 Hasselt

- **2 l vocht / 24 uur.**

- Patiënt kan of mag niet eten.

1 l Glucose 5% / 12 u afwisselend met 1 l multion / 12 u

- Patiënt mag eten.

1 l NaCl 0.9 % / 12u

Aanpassen bolus voor het eten.

Gedurende 1 uur : + 2 E.

- **actrapid drip → 50 E actrapid / 50 ml Nacl 0.9%**

< 100 mgdl	=	0.5 E / uur
< 150 mgdl	=	1 E / uur
tss 150 – 200 mgdl	=	2 E / uur
tss 200 – 250 mgdl	=	3 E / uur
tss 250 – 300 mgdl	=	4 E / uur
tss 300 – 350 mgdl	=	5 E / uur
> 350 mgdl	=	6 E / uur

Campus Salvator

Salvatorstraat 20

B-3500 Hasselt

T +32(0)11-28 91 11

F +32(0)11-27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8

B-3540 Herk-de-Stad

T +32(0)13-55 17 11

F +32(0)13-55 07 09

www.CAZ.be

info@CAZ.be