

Glitazone : informatie voor de patiënt

De huisarts heeft in het kader van de behandeling van je diabetesprobleem
..... (naam Glitazone invullen) opgestart.

Deze medicatie maakt je lichaam gevoeliger aan je eigen insulinewerking. Dit geeft doorgaans een **goede daling van de bloedsuiker**.

Alhoewel het zelden voorkomt, kan dit type van medicatie de bloedsuiker te veel doen dalen (**een hypo veroorzaken**). Lees nogmaals aandachtig de hypo-instructies (formulier hypo-instructie).

Aandachtspunten:

- Deze medicatie kan om het even op welk tijdstip van de dag ingenomen worden. Je moet ze wel **alle dagen op hetzelfde tijdstip** nemen.
- Je kan door deze medicatie meer vocht ophouden. Verwittig de huisarts wanneer je dikke voeten krijgt of je wanneer je gewicht plots toeneemt (meer dan 2 kg per week)
- Deze medicatie wordt nooit gegeven in combinatie met insuline.

Opvolging:

- De huisarts zal, zeker in het begin, je bloedsuiker regelmatig moeten controleren om de dosis af te stellen. Het is handig om je een bloedglucosemeter aan te schaffen. Dan kan je deze metingen zelf doen, en de resultaten met je huisarts bespreken.
- Controleer wekelijks je gewicht, en raadpleeg je huisarts 2 weken na het opstarten van deze medicatie (om na te gaan of je te veel vocht ophoudt).
- Laat ook om de 3 maanden bloed nemen voor dosage van HbA1c (geeft een idee van de gemiddelde bloedsuikerspiegel van de laatste 3 maanden).