

# Insuline-Tolerantie Test



## **Wat is de insuline-tolerantietest?**

Dit onderzoek dient om te bepalen of u voldoende groeihormoon aanmaakt.

Men doet dit door u een bepaalde stof, insuline, toe te dienen, en vervolgens op gezette tijden wat bloed af te nemen.

## **Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?**

Voor de test wordt u opgenomen op de afdeling dagopname of op de verpleegafdeling, voor de duur van de test.

U meldt zich 's ochtends op het afgesproken tijdstip op de afgesproken verpleegafdeling. U dient nuchter te zijn, dus u mag na 24.00 uur op de avond voorafgaand aan het dag van het onderzoek niet meer eten, drinken, roken of medicijnen innemen. Ook is het belangrijk dat u nog geen inspanning verricht heeft.

Op de verpleegafdeling brengt men een naaldje in een bloedvat. Behalve de prik van het inbrengen, voelt u dit verder niet. Via het naaldje neemt men wat bloed af, dit is pijnloos. Na een half uur neemt men nog wat bloed af.

Vervolgens krijgt u wat insuline ingespoten. Dit is een stof die uw bloedsuikergehalte en uw groeihormoongehalte regelt, en die ook van nature in uw lichaam voorkomt.

Na 10, 20, 30, 45 60, 90 en 120 minuten na het inspuiten van de insuline neemt men via het naaldje steeds wat bloed af.

In totaal duurt het onderzoek 2½ uur.

## **Bijwerkingen**

Het is mogelijk, dat door het toedienen van insuline, uw bloedsuiker te laag wordt. U voelt zich dan moe, duizelig en hongerig. Ook kunt u bleek worden, en voelen dat u gaat transpireren.

Men noemt dit ook wel een hypoglycaemie. U heeft dan bepaalde medicatie nodig. Om elk risico uit te sluiten blijft u gedurende het hele onderzoek onder toezicht van een verpleegkundige. Deze zal de juiste maatregelen nemen indien u zich onwel gaat voelen.

## **Samenvatting**

- Deze test dient om te onderzoeken of u voldoende groeihormoon aanmaakt.
- U dient nuchter te zijn vanaf 24.00 uur op de avond voorafgaand aan het onderzoek.
- Op de ochtend van het onderzoek mag u geen medicatie innemen, en ook geen inspanning verrichten.
- Eerst wordt er tweemaal wat bloed afgenomen, via een naaldje dat van te voren bij u ingebracht is.
- Vervolgens krijgt u een medicijn ingespoten.
- Daarna wordt nog zeven maal wat bloed afgenomen via de verblijfsnaald.
- U wordt geobserveerd door een verpleegkundige, die u een medicijn toedient als u zich door het ingespoten medicijn minder goed voelt.
- Het onderzoek duurt in totaal 2,5 uur.

## Heeft u nog vragen?

Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het **laboratorium, telefoon 040-2864866**.

**LAB007**  
**11-06**