

Behandeling van gastroparesis diabetorum

G. Huygh, C. Mathieu

Tijdschr Geneesk 2000; 56: 260-267

Als aanvulling op hogervermeld artikel dient gewaarschuwd te worden voor een combinatietherapie met cisapride en erytromycine. Deze combinatie kan immers via een verlenging van het QT-interval ernstige hartritmestoornissen (voornamelijk torsade de pointes) veroorzaken.

In dit kader dient ook vermeld te worden dat cisapride evenmin gelijktijdig voorgeschreven mag worden met o.a. andere macroliden, HIV-protease-inhibitoren en diverse antimycotica, anti-arrhythmica en antidepressiva (1). In een bijdrage in „British Medical Journal” gaat de auteur nog verder: „[...] the drug is contraindicated in patients with chronic obstructive lung disease, congestive heart failure, advanced cancer, and in patients with electrolyte disorders, such as hypomagnesaemia and hypokalaemia. Patients taking insulin and those with nausea, vomiting, diarrhoea, and dehydration are also warned against taking cisapride” (2).

Tot slot van deze aanvulling omtrent de veiligheid van cisapride (Prepulsid, Cyprid) wensen wij er nog op te wijzen dat de producent Janssen Pharmaceutica op basis van een rapport over 341 patiënten met hartritmestoornissen (waaronder 80 overlijdens) besliste om de verkoop van cisapride in de Verenigde Staten van Amerika vanaf 14 juli 2000 stop te zetten (3).

*Dr. P. Calle,
Dienst Spoedgevallen,
Universitair Ziekenhuis, Gent.*

LITERATUUR

1. VISKIN S. Long QT syndromes and torsade de pointes. Lancet 1999; 354: 1625-1633.
2. JOSEFSON D. FDA warns about heartburn drug (news). Br Med J 1998; 317: 101.
3. FDA Talk Paper: Janssen Pharmaceutica stops marketing cisapride in the US. <http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/ANS01007.html>